Les Aristoloches, *Aristolochia*.

1°. Le calice est supérieur & d'une seule pièce, en tuyau, s'élargissant à son sommet; il n'y a point de corolle: 2°. le stigmate est court, divisé en six parties à son extrémité: 3°. les étamines au nombre de six ou de douze: 4°. le fruit est une capsule à six loges, renfermant un grand nombre de semences.

Aristolochia, *Asarum*.

CLASSE V.

DICOTYLÉDONES APÉTALES : dont les étamines sont insérées au calice.

Les Eléagnus, *Elæagni*.

1°. Le calice est d'une seule pièce en tuyau: 2°. le germe est inférieur avec un style & un stigmate: 3°. il y a quatre étamines: 4°. le fruit est une baie à une seule loge, une seule semence.

Osyris, *Hyppophæ*, *Elæagnus*, *Nissa*, *Conocarpus*, *Buccida*.

Les Thymelées, *Thymeleæ*.

1°. Le germe est supérieur: 2°. les étamines sont attachées à la partie supérieure du calice en tuyau.

Thestium, *Passerina*, *Lachnaæ*, *Dirca*, *Daphne*, *Gnidia*, *Struthiola*, — *Quisqualis*?

Les Pimprenelles, *Sanguisorbæ*.

1°. Le calice est d'une seule pièce, découpé & resserré à son sommet : 2°. les étamines s'attachent à la partie supérieure du calice : 3°. il y a un ou deux germes : 4°. les feuilles sont alternes.

Alchimilla, Aphanes, Cliffortia, Sanguisorba, Adoxa ?

Les Turquettes, *Herniariæ*.

1°. Le calice est d'une seule pièce, avec quatre ou cinq découpures : 2°. le nombre des étamines est double de celui des divisions du calice, (il y en a huit à dix, suivant que le calice est divisé en quatre ou cinq parties) : 3°. il y a deux styles, ou le style est divisé en deux : 4°. un ou deux germes : 5°. les semences sont recouvertes par le calice, qui se resserre : 6°. les feuilles sont opposées.

Scleranthus, Galenia, Herniaria, Illecebrum.

Les Persicaires ou Polygonées, *Polygonæ*.

1°. Le calice turbiné, ou autrement en forme de poire, est ordinairement divisé en six parties; il persiste avec le fruit : 2°. les étamines sont en petit nombre, communément huit, attachées au milieu du calice : 3°. le germe est supérieur; ou il n'y a point de styles, ou il y en a plusieurs, mais le plus souvent trois; il y a aussi plusieurs stigmates : 4°. une semence nue ou enveloppée par le calice; l'embryon enfoncé

dans un corps farineux : 5°. les feuilles sont alternes, en gaine à leur base. Les plus jeunes sont repliés en dessous.

Polygonum, *Coccoloba*, *Atraphaxis*, *Rumex* ;
Rheum, *Trophis*, *Triplaris*.

Les Bazelles, *Basellæ*.

Elles different des Perficaires par leurs feuilles ; qui ne sont, ni en gaine, ni repliées.

Basella, *Camphorosma*, *Polychnemum*, *Corrigiola*, *Telephium*.

CLASSE VI.

DICOTYLÉDONES APÉTALES : dont les étamines sont attachées au support, ou autrement insérées sous le pistil.

Les Arroches ; *Atriplices*.

1°. Le calice est d'une seule piece, mais découpé : 2°. les étamines sont en petit nombre : 3°. le germe est supérieur ; il y a deux stiles, ou le stile est divisé en deux : 4°. il n'y a qu'une semence recouverte.

Anabasis, *Salsola*, *Spinacia*, *Acnida*, *Beta* ;
Atriplex, *Chenopodium*, *Cruzita*, *Parietaria* ?
. . . . *Axyris*, *Blitum*, *Ceratocarpus*, *Salicornia*, *Coryspermum*.

Les Phitolacca, *Phytolacœæ*.

1°. Le calice est d'une seule piece, mais découpé : 2°. les fleurs ont un ou plusieurs germes,